



Rafael Ramos Vecchio, MD
Plastic & Reconstructive Surgeon

220 Alhambra Circle, First Floor, Coral Gables, FL 33134

📞 (305) 960-7511 📩 raramos@careagaplasticsurgery.com 📸 Instagram: drrafaramos

Abdominoplastia – Instrucciones post operatorias

Gracias por elegir Careaga Plastic Surgery para su cirugía. Estas instrucciones están diseñadas para ayudarle a tener una recuperación segura y obtener los mejores resultados posibles. Por favor, lea todo cuidadosamente y comuníquese con nuestra oficina si tiene cualquier duda o cambio inesperado.

Medicamentos que debe tomar

- Cefalexina (o Clindamicina) – si se le recetó antibióticos, estos ayudan a reducir el riesgo de infección. Comience la noche de su cirugía y continúe durante 5–7 días según lo indicado. Siempre tómelos con alimentos.
- Pomada – si las incisiones quirúrgicas están expuestas al aire, puede aplicar Vaselina (o Bacitracina si fue recetada) para evitar que las gasas se adhieran a las incisiones. Aplíquela dos veces al día según las indicaciones.

Medicamentos que puede tomar si es necesario

- Acetaminofén (Tylenol) – para dolor leve o moderado. Evite aspirina, ibuprofeno u otros antiinflamatorios (NSAIDs) durante 2 semanas.
- Hidrocodona o Tylenol #3 – puede haber recibido un segundo medicamento para el dolor; tómelo solo según necesidad cada 6 horas. Tómelo con un ablandador de heces, ya que puede causar estreñimiento. Si el dolor está controlado, prefiera solo Tylenol.
- Ondansetrón (Zofran) – para náuseas, si fue recetado.
- Ablandador de heces – si usa analgésicos con receta, tómelo diariamente para evitar el estreñimiento.

Vendajes y cuidado de drenajes

- Si sus incisiones están cubiertas con steri-strips o cinta quirúrgica: mantenga la cinta adhesiva hasta que se caiga sola. Se despegará en 10–14 días. Si se levanta parcialmente, puede recortar los bordes sueltos.



Rafael Ramos Vecchio, MD
Plastic & Reconstructive Surgeon

220 Alhambra Circle, First Floor, Coral Gables, FL 33134

📞 (305) 960-7511 📩 raramos@careagaplasticsurgery.com 📸 Instagram: drrafaramos

- Si tiene un apósito amarillo sobre el ombligo, déjelo en su lugar. Será retirado en su cita de control a la semana.
- Si las incisiones están cubiertas con gasas sueltas, aplique Vaselina dos veces al día sobre las heridas.
- Si tiene drenajes quirúrgicos, vacíelos dos veces al día o cuando estén a la mitad. Registre el color y la cantidad de drenaje en mililitros (mL).
- Lleve su registro de drenajes a la cita de control. Los drenajes generalmente se retiran cuando el volumen es menor a 25–30 mL (\approx 1 oz) en 24 horas durante dos días consecutivos, aunque esto puede variar.
- Mantenga los sitios de salida del drenaje limpios y cubiertos con gasas pequeñas; cambie los apóritos diariamente o cuando se ensucien.
- Si tuvo liposucción, usará una prenda compresiva. Es normal tener algo de drenaje con líquido sanguinolento; puede reemplazar las gasas absorbentes según necesidad.

La noche de su cirugía

- Duerma en posición semi-reclinada, con la cabeza y las rodillas ligeramente elevadas, para reducir la hinchazón y la tensión en el abdomen.
- Use la faja abdominal o prenda compresiva en todo momento, excepto para ducharse.
- Es normal sentir presión o tirantez abdominal. Evite girar o impulsarse con los brazos para levantarse.
- Coma alimentos suaves y ligeros; evite los alimentos salados que puedan aumentar la hinchazón.
- Al caminar, mantenga una posición ligeramente encorvada para disminuir la tensión en la piel.

La mañana siguiente y la primera semana

- Continúe durmiendo con el torso elevado durante al menos una semana.



Rafael Ramos Vecchio, MD
Plastic & Reconstructive Surgeon

220 Alhambra Circle, First Floor, Coral Gables, FL 33134

📞 (305) 960-7511 📩 raramos@careagaplasticsurgery.com 📸 Instagram: drrafaramos

- Puede ducharse 48 horas después de la cirugía. Permita que el agua tibia fluya suavemente y séquese con palmaditas. Reemplace los apósitos después.
- No se sumerja en baños, piscinas o jacuzzis durante al menos 6 semanas.
- Reaplique la pomada sobre las incisiones dos veces al día después de la limpieza si las heridas no están cubiertas con cinta adhesiva.
- Es normal presentar moretones e hinchazón por 2–3 semanas; irán mejorando gradualmente.
- Camine despacio por su casa varias veces al día para favorecer la circulación y disminuir el riesgo de coágulos.
- Evite inclinarse hacia adelante, levantar peso o levantar los brazos por encima de los hombros durante 2 semanas.

Actividad física

- No levante objetos de más de 10 lb (4.5 kg) durante 3 semanas.
- Evite ejercicio, conducir o actividad sexual hasta que el Dr. Ramos lo autorice (usualmente después de 3–4 semanas).
- Puede comenzar caminatas ligeras después de una semana, pero evite ejercicios abdominales o estiramientos por 6 semanas.
- Evite fumar o vapear durante la recuperación, ya que retrasa la cicatrización.
- Evite el calor directo o la exposición solar en el abdomen por 3 meses.

Cuidado de cicatrices y piel

- Mantenga las incisiones limpias y secas. Cuando los Steri-Strips se caigan y las heridas estén cerradas, puede comenzar con gel o láminas de silicona (generalmente después de 2 semanas).
- Use protector solar SPF 30 o superior diariamente sobre las cicatrices una vez cerradas para prevenir oscurecimiento.



Rafael Ramos Vecchio, MD
Plastic & Reconstructive Surgeon

220 Alhambra Circle, First Floor, Coral Gables, FL 33134

📞 (305) 960-7511 📩 rramos@careagaplasticsurgery.com 📸 Instagram: drrafaramos

- La falta de sensibilidad, tirantez y firmeza son normales y mejorarán en los siguientes meses.
- Despues de 2 semanas, si las heridas están cerradas, puede usar cinta de silicona o cremas de silicona (disponibles sin receta en farmacias).

Visitas de control

- Primera visita: 1–3 días después de la cirugía para revisar o retirar drenajes.
- Segunda visita: a la semana para evaluar la cicatrización y retirar puntos si los hay.
- Visitas adicionales: a las 3 semanas, 6 semanas, 3 meses y según necesidad.

Cuándo llamar a la oficina

- Fiebre persistente mayor de 101 °F (38.3 °C).
- Enrojecimiento o calor excesivo alrededor de las incisiones.
- Drenaje con mal olor o aspecto purulento.
- Aumento repentino de la hinchazón abdominal.
- Dolor que no mejora con la medicación.
- Dificultad para respirar o dolor en el pecho.

Si presenta síntomas urgentes fuera del horario, acuda a la sala de emergencias más cercana.